唇部填充剂产品手册

CERESFILL®

LIP

高端透明质酸唇部填充剂
含0.3%盐酸利多卡因
1.1 mL 预灌封注射器

Design your Lips with CERES

生产企业 CHEUN BIOTECH Co., Ltd. | 经销商 MY Korea Trade Co., Ltd.



产品概述

为美唇而生

CERESFILL® LIP

CERESFILL® LIP 是一款含0.3%盐酸利多卡因的透明质酸填充剂，专为唇部丰盈与塑形设计。产品沿用CERESFILL®成熟配方，并添加氰钴胺（维生素B12），使凝胶呈现标志性的红色。



交联透明质酸

20 mg/mL

与CERESFILL®系列相同的透明质酸浓度

盐酸利多卡因

0.3%

内含局部麻醉成分，治疗过程更舒适

氰钴胺

B12

维生素B12赋予凝胶标志性的红色

每支

1.1 mL

预灌封注射器，每盒1支

产品特点

选择 CERESFILL® LIP 的四大理由

CERESFILL® LIP

01

标志性红色凝胶

氰钴胺（维生素B12）使凝胶呈红色，CERESFILL® LIP 一眼可辨。

02

细腻柔软的质地

基于120'细颗粒配方，推注顺滑，唇部触感柔软自然。

03

塑形与丰盈

专为唇部填充开发：唇部更丰盈，唇形轮廓更清晰。

04

舒适的治疗体验

0.3%盐酸利多卡因有助于减轻注射时的不适感。



标志性红色

CERESFILL® LIP 的专属色彩

CERESFILL® LIP 采用与CERESFILL® 120′相同的细颗粒透明质酸凝胶，并在配方中添加了氰钴胺（维生素B12）。

相同的基础配方

交联透明质酸20 mg/mL，含0.3%利多卡因，与CERESFILL® 120′一致

氰钴胺（维生素B12）

一种水溶性维生素，使凝胶呈现自然的红色

便于识别

红色凝胶使唇部专用产品与常规系列易于区分



氰钴胺为配方成分之一。适用范围请以使用说明书为准。

适用部位

专为唇形与丰盈设计

CERESFILL®
LIP

细颗粒与柔软的凝胶，帮助医生塑造自然、协调的唇部效果。



1	**唇部丰盈**	上唇与下唇唇体
2	**唇部轮廓**	唇红缘塑形
3	**唇峰**	上唇唇峰塑形
4	**人中嵴**	自然的人中线条
5	**嘴角**	口角部位

以上部位仅供参考，产品使用、注射深度及用量由主治医生决定。

CERESFILL® LIP

治疗前后对比

使用 CERESFILL® LIP 治疗后，唇部丰盈自然，唇形轮廓更清晰。



案例 01 · 唇部丰盈

照片来自临床治疗案例，效果因人而异。



案例 02 · 唇形与轮廓

临床案例

唇部更平滑、更丰盈、更水润

CERESFILL® LIP



治疗前（左） • 治疗后（右）



治疗后

表面更平滑

唇纹明显柔化

更加丰盈

唇部更饱满、轮廓更清晰

水润光泽

呈现健康的水光质感

照片来自临床治疗案例，效果因人而异。

CERESFILL® LIP

CERESFILL®
LIP



产品摄影



标志性红色



产品包装

规格参数

CERESFILL®
LIP

产品名称	含利多卡因的透明质酸唇部填充剂
品牌	CERESFILL® LIP
成分	交联透明质酸 20 mg/mL 盐酸利多卡因 3 mg/mL（0.3%） 氰钴胺（维生素B12）
凝胶性状	细颗粒交联透明质酸凝胶（CERESFILL® 120'级别），红色
包装规格	1.1 mL × 1支预灌封注射器 / 盒
主要用途	唇部丰盈与唇形轮廓
注射针 / 储存	详见使用说明书
生产企业	CHEUN BIOTECH Co., Ltd.



品质管理

基于 CERESFILL® 质量控制体系

CERESFILL® LIP

CERESFILL® LIP 采用与CERESFILL®系列相同的透明质酸填充剂基础，并依据5 SP（安全与精准）参数进行管控。

01



残留BDDE

通过纯化工艺去除未反应的交联剂

02



悬挂BDDE

优化工艺，提高交联完整性

03



低分子量透明质酸

管控LMW-HA的生成

04



溶胀率

设定上限，减少早期肿胀

05



炎症反应

通过炎症相关指标进行评价

使用指南

使用方法与注意事项

CERESFILL® LIP

操作步骤

1 **消毒** 清洁并消毒唇部及周围皮肤。

2 **安装** 取下注射器护帽，将配套注射针旋紧固定。

3 **注射** 少量、缓慢注射，进行塑形与丰盈。

4 **塑形** 必要时轻柔按摩，使效果均匀。

注意事项

- 禁止注入血管内
- 有唇疱疹病史者可能复发
- 避免过量注射，以免引起严重肿胀
- 一次性使用，请勿重复使用或再次灭菌
- 对利多卡因或透明质酸过敏者禁用

术后护理

- 12小时内避免唇部化妆
- 2周内避免桑拿及过热或过冷环境
- 可能出现短暂肿胀或发红，约持续1周

完整的警告信息及禁忌证，请参阅使用说明书。

联系方式

生产企业与经销商

生产企业

CHEUN BIOTECH Co., Ltd.

B-1407·1408, 99 Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13201,
Republic of Korea

+82-31-789-6844 · www.cheunbiotech.com

经销商

MY Korea Trade Co., Ltd.

B-1407, 99 Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

+82-2-2215-3888

CERESFILL® LIP

Design your Lips with CERES

